METULJI KUNŠPERŠKEGA POLJA

Kunšperško polje – dom 500 vrstam rastlin, gliv in živali

DNEVNI METULJI

V Sloveniji je prisotno 180 različnih vrst dnevnih metuljev, od tega jih polovico poznamo tudi na Kozjanskem in v Obsotelju. Njihov razvoj se začne z jajčecem, ki ga samica odloži na rastlino, s katero se potem gosenica hrani. Doraščena gosenica se zabubi in preobrazi v odraslega metulja. Nekatere vrste imajo le eno generacijo v letu, druge tudi do tri. Odrasli se hranijo le z nektarjem cvetočih rastlin (cevast rilček). Niso pa vsi metulji, ki letajo podnevi dnevniki, saj so aktivni tudi nekateri nočniki. Metulji so simbol lepote, krhkosti in tudi ljubezni.



KATANČEV SELEC, zeleni bijelac, eastern bath white, *Pontia edusa*

Selivska vrsta, odrasli osebki od marca do oktobra v več generacijah.



ZORICA, zorica, orange-tip
Anthocharis cardamines

Odrasli od marca do junija, gosenice na gozdnih vrstah križnic. Samica brez oranžne barve.



CITRONČEK, žućak, brimstone,
Gonepteryx rhamni

Pogosto napačno imenoval cekinček. Poletna generacija leta do jeseni, prezimi in leta še spomladi. Samica svetlejša.



KAPUSOV BELIN, kapusov bijelac, large white, *Pieris brassicae*

Največji med belini, od marca do jeseni najmanj dve generaciji. Namnožitev gosenic lahko naredi škodo na kapusu.



REPIN BELIN, repičin bijelac, small white,
Pieris rapae

Manjši od kapusnega belina, tudi črna pega na koncu krila manjša. Več generacij od marca do novembra.




NAVADNI MODRIN, obični plavac, common blue, *Polyommatus icarus*

Od aprila do oktobra v dveh ali treh generacijah. Pogosta vrsta, gosenice se hranijo na metuljnicah..




RUMENOOKI KUPIDO, kratkorepi strjeličar, short-tailed blue, *Cupido argiades*

Manjša vrsta modrina, leta od aprila do avgusta. Na koncu kril lažne oči in tipalke, da preslepi plenilce.



MOČVIRSKI CEKINČEK, kiseličin vatreni plavac, large copper, *Lycaena dispar*

Odrasli od maja do septembra v dveh generacijah. Gosenice se hranijo na kislicah, ki uspeva na mokrotnih travnikih.




TEMNI CEKINČEK, točkasti vatreni plavac, sooty copper, *Lycaena tityrus*

Od aprila do oktobra na suhih in vlažnih travnikih ter na gozdnem robu. Dve generaciji na leto. Gosenice na kislici.




MALI CEKINČEK, mali vatreni plavac, small copper, *Lycaena phleas*

Najmanjši med cekinčki leta od marca do oktobra v 2 ali 3 generacijah. Gosenica na kislicah ali dresnih.



NAVADNI SENOŽETNIK, obični poštar, clouded yellow, *Colias croceus*

Selivska vrsta od aprila do novembra v več generacijah. Na spodnji strani drugega krila bela lisa v obliki števila 8.




JADRALEC, prugasto jedarce, scarce swallowtail, *Iphiclides podalirius*

Odrasli od maja do septembra v dveh generacijah. Gosenice na črnem trnu. Na koncu kril lažne tipalnice in oči.




MALI KOPRIVAR, koprivina riđa, small tortoiseshell, *Aglais urticae*

Odrasli letajo od maja do oktobra, jesenska generacija prezimi in leta še spomladi. Gosenice na listih velike koprive.



ADMIRAL, lijepokrili admiral, red admiral
Vanessa atalanta

Odrasli od junija do oktobra, prezimijo in letajo še spomladi. Gosenice na listih koprive, odrasli radi sesajo sok sadja.



OSATNIK, stričkovac, painted lady,
Vanessa cardui

Rekorder med selivci (do 3.000 km). Odrasli med marcem in oktobrom v več generacijah. Gosenice na osatih, bodakih



KOPRIVOV PAKČEVINAR, šumska riđa, map butterfly, *Araschnia levana*

Od aprila do septembra v dveh generacijah – osebki obeh se povsem razlikujejo – dimorfizem (foto – poletna generacija).



LEŠNIKAR, veliko volovsko oko, meadow brown, *Maniola jurtina*

V eni podaljšani generaciji letajo od maja do septembra. Ena najbolj pogostih vrst dnevnih metuljev. Gosenice na travah.



GOZDNI PEGAVČEK, lugar, speckled wood
Pararge aegeria

Od marca do oktobra v več generacijah. Poseljuje svetle gozdove, gozdne jase. Gosenice se hranijo na travah.




MALI OKARČEK, obični okaš, small heath
Coenonympha pamphilus

Med marcem in oktobrov v več generacijah. Gosenice se hranijo na travah. Eden najbolj pogostih dnevnikov.



TRAVNAR, bijeli šumski vratar, great banded grayling, *Brintesia circe*

Eden največjih dnevnih metuljev pri nas. Leta od maja do oktobra v eni sami generaciji. Počiva na lubju (mimikrija).




GOSPICA, zelena sedefica, silver-washed fritillary, *Argynnis paphia*

Eden največjih pisančkov leta od julija do septembra. Pogosta vrsta gozdnega roba. Gosenice se hranijo na vijolicah.



MALI TRATAR, tkalčev šarenac, weaver‘s fritillary, *Boloria dia*

Odrasli od aprila do septembra v 2 do 3 generacijah. Značilno vijolično srebrno obarvanje na spodnji strani kril.




MALI KRESNIČAR, mala zebra, common glider, *Neptis sappho*

Vrsta nižinskih gozdnih robov. Odrasli od maja do avgusta v eni sami generaciji. Gosenice na spomladanskem grahorju.



NAVADNI PISANČEK, obična riđa, heath fritillary, *Melitaea athalia*

Ena pogostejših vrst leta od maja do avgusta. Potrebna previdnost pri določanju – več podobnih vrst.



JETIČNIKOV PISANČEK, zlaćana riđa, nickerl‘s fritillaria, *Melitaea aurelia*

Odrasli aktivni od maja do avgusta, težko ločevanje od podobnega temnega pisančka. Gosenice na trpotcih.