VODNA FAVNA KUNŠPERŠKEGA POLJA

Kunšperško polje – dom 500 vrstam rastlin, gliv in živali

VODNE ŽIVALI

Struga reke Sotle, ostanki nekdanjih mrtvic in drenažni kanali ustvarjajo raznoliko mrežo vodnih in mokrotnih okolij. Tudi brez pasti, lova se opazi raznoliki živalski svet. Z brežine se opazijo v vodi plavajoče ribe, na prodišču lupine školjk in črno obarvanih polžev. Predvsem spomladi se nam večkrat pokažejo dvoživke, preko poletja pa številne vodne žuželke – predvsem kačji pastirji in mladoletnice. V sušni sezoni je dno mrtvic razkrilo novo vrsto školjke za porečje Sotle – navadni krožec. Pestrost življenja v vodnih okoljih nas zavezuje, da jih ohranjamo in ustrezno obnavljamo.



ROSNICA, šumska smeđa žaba, agile frog *Rana dalmatina*

Gozdna vrsta, zgodaj spomladi v mlake odloži mreste (vsaka samica posebej)



ZELENE ŽABE, zelene žabe, water frogs *Pelophylax sp.*

Tri zelo podobne vrste, od vseh dvoživk se odrasli najdlje zadržujejo v vodi (do jeseni).



NAVADNA KRASTAČA, smeđa krastača, common toad, *Bufo bufo*

Gozdna vrsta, spomladi v mlakah odloži mrest v obliki dolge želatinaste ogrlice.



POHRA, mrena potočna, mediterranean barbel *Barbus meridionalis*

Po hrbtu pegasto obarvana sorodnica mrene. Živi v živahno tekočih vodah.



KLEN, klen, common chub *Squalius cephalus*

Do pol metra dolga roparska riba. Spomladi se drsti na prodiščih hitro tekoč rek.



NAVADNI ŠKRŽEK, obična lisanka, thic shelled river mussel, *Unio crassus*

Vrsta čistih tekočih voda, nekoč zelo pogosta vrsta. Na prodiščih opazimo njene lupine.



NAVADNI KROŽEC, -, european fingernail clam, *Sphaerium corneum*

Do 1 cm velika školjka čistih stoječih voda. Prvo opažanje vrste v Obsotelju v 2026.



KRATKA ČRNKA, -, - *Holandriana holandrii*

Pogosta vrsta vodnega polžka, ki objeda alge na prodnikih tekočih voda.



ZMAJEVKA, -, green drake mayfly *Ephemera danica*

kot vodna ličinka živi dve leti, kot odrasla živi le nekaj dni – da poskrbi za potomstvo.



TRAVNIŠKI ŠKRATEC, -, azure damselfly *Coenagrion puella*

Najbolj pogosta vrsta kačjega pastirja pri nas. Izbira vode s plavajočimi rastlinami.




PASASTI BLEŠČAVEC, prugasta konjska smrt, banden demoiselle, *Calopteryx splendens*

Živi ob neosenčenih potokih, rekah, tudi kanalih. Del krila brezbarven.



MODRI BLEŠČAVEC, modra konjska smrt, beautiful demoiselle, *Calopteryx virgo*

Poseljuje zasenčene odseke vodotokov, tudi take s hitrim pretokom vode.



ZELENOMODRA DEVA, modri kralj, southern hawker, *Aeshna cyanea*

Eden največjih kačjih pastirjev pri nas. Samci preganjajo vrstnike, lovijo druge žuželke.



SINJI PRESLIČAR, bijelonoga potočnica, white-legged damselfly , *Platycnemis pennipes*

Ena najbolj pogostih vrst kačjih pastirjev. Slabi letalci, odrasli od aprila do novembra.



NAVADNI KAMENJAK, mali strijelac, vagrant darter, *Sympetrum vulgatum*

Vrsta poznega poletja in jeseni. Rad poseda na tleh ali listih grmovja. Rdeče obarvanje je značilno za samce.



MODRI PLOŠČEC, četveropjega vretica, broad-bodied chaser, *Libellula depressa*

Samec značilno svetlo modre barve. Hiter letalec, rad poseda na izpostavljenih prežah. Preganja druge kačje pastirje.



MALI MODRAČ, zapadni vilenjak, keeled skimmer, *Orthetrum coerulescens*

Manjša vrsta. Rad poseda na tleh ali suhih bilkah. Ni zelo teritorialen. Tudi ob vodotokih, kjer voda ni povsem čista.



NAVADNA MREŽEKRILKA, -, - *Oligostomis reticulata*

Vrsta mladoletnice leta aprila in maja, ličinke opazimo od jeseni do pomladi. Tulec ličinke je iz kvadratastih koškov rastlin.




MLADOLETNICA, -, - *Anabolia furcata*

V poletnem času letajoča vrsta, ki jo privabi svetloba. Ličinka živi v tulčastem ovoju v plitvi, počasi tekoči vodi.



CIMETASTA MLADOLETNICA, -, - *Limnephilus lunatus*
Opažena od maja do pozne jeseni, prepoznavna po sveTli lisi na koncu kril (kot del lune).



EVROPSKI BOBER, dabar, eurasian beaver, *Castor fiber*

Po več kot stoletju odsotnosti že 20 let zopet v Sotli. Nočno aktiven, tedaj se pase na travniku ob vodi, pozimi pa je lubje.



NUTRIJA, barska nutrija, nutria *Myocastor coypus*

Tujerodna invazivne vrsta sesalca. Od bobra se loči po mišjem repu, belih dlakah na gobčku in aktivnosti izven nočnega časa.



ČRNI POTAPNIK, vrani vodoljub, great silver water beetle, *Hydrophilus piceus*

Kot vodna ličinka je izsesaval polže, odrasel je okoren potapljač (z zalogo zraka na trebušni strani) in tudi leti.



POPISANA GIZDAVKA, crvenouha kornjača, pond slider, *Trachemys scripta*

Tujerodna vrsta želve, ki pogosto iz domačih akvarijev konča v Sotli ali mrtvici ob njej. V naravi se že tudi razmnožuje.



BELOUŠKA, bjelouška, grass snake *Natrix natrix*

Z belimi „ušesi“ lahko prepoznavna vrsta nestrupene kače, Lovi predvsem žabe in male glodalce.

Kozjanski park urejanje, besedilo, fotografije: Dušan Klenovšek,,